PBVE chez le nouveau-né

A ajouter à la fiche de J Griffet pour les antécédents obstétricaux et l'examen initial du nouveau-né

Examen clinique selon la classification de A. Diméglio
Les amplitudes articulaires sont mesurées en position de réduction maximale

			Pied D	Pied G
Equin (arrière-pied) :	> 45° :	4 points		
	20 à 45° :	3 points		
	0 à 20° :	2 points		
	dorsiflexion	1 point		
Varus (arrière-pied) :	> 45° :	4 points		
	20 à 45° :	3 points		
	0 à 20° :	2 points		
	abduction	1 point		
Rotation médiale :	> 45° :	4 points		
	20 à 45° :	3 points		
	0 à 20° :	2 points		
	rotation latérale	1 point		
Adduction (avant-pied) :	> 45° :	4 points		
	20 à 45° :	3 points		
	0 à 20° :	2 points		
	abduction	1 point		
4 points supplémentaires :				
	pli postérieur :	1 point		
	pli médio-pied :	1 point		
	cavus :	1 point		
	hypertonie, atrophie, fibrose :	1 point		
	TOTAL des points			

Sévérité selon le score

Type 4 : 16 à 20 points
Type 3 : 11 à 15 points
Type 2 : 6 à 10 points
Type 1 : 0 à 5 points

Examen clinique général :

Plagiocéphalie	oui	non	
Torticolis	oui	non	
Rachis : dysraphisme	oui	non	
Hanches : luxation	oui	non	
Genoux : anomalie	oui	non	en clair :

Examen neurologique :

Hypotonie axiale	oui	non
Hypertonie périphérique	oui	non
Hyperreflectivité rotulienne	oui	non

Autre anomalie (en clair) :